

Errata a “A Cirurgia de Substituição Valvular Aórtica Melhora a Qualidade de Vida dos Doentes?” Pedro COELHO, Lara N. FERREIRA, Clara VITAL, José FRAGATA. Acta Med Port 2018 Jul-Aug;31(7-8):399–408

Erratum to “Does Aortic Valve Replacement Surgery Improve Patients’ Quality of Life?”, by Pedro COELHO, Lara N. FERREIRA, Clara VITAL, José FRAGATA. Acta Med Port 2018 Jul-Aug;31(7-8):399–408

Na página 405, Tabela 3, onde se lê:

**A negrito, o valor 34,4 na dimensão “limitação do Desempenho” referente à coluna “Seguimento a 6 meses”**

Tabela 3 – Estimativas da população relativamente às dimensões do SF-6D (%)

Dimensões do SF-6D / níveis		Amostra inicial (n = 506)	Seguimento a 3 meses (n = 458)	Seguimento a 6 meses (n = 457)	Seguimento a 1 ano (n = 442)	População Portuguesa <sup>42</sup>
<b>Função física</b>	1	4,3	4,4	9,0	12,7	<b>37,8</b>
	2	5,3	17,7	19,5	23,5	31,2
	3	26,9	<b>42,0</b>	<b>38,9</b>	<b>33,0</b>	18,1
	4	25,5	27,6	24,3	20,6	2,9
	5	<b>28,5</b>	5,7	6,3	8,1	7,9
	6	9,5	2,6	2,0	2,0	2,2
<b>Limitação do desempenho</b>	1	10,5	24,3	<b>34,4</b>	<b>39,9</b>	<b>44,8</b>
	2	12,6	26,8	25,6	21,2	12,0
	3	4,5	2,0	2,2	1,8	13,8
	4	<b>72,3</b>	<b>46,9</b>	37,9	37,1	29,4
<b>Função social</b>	1	<b>30,4</b>	<b>59,9</b>	<b>64,3</b>	<b>67,2</b>	<b>55,8</b>
	2	20,6	26,4	21,0	19,1	15,5
	3	26,5	9,0	10,1	7,3	18,7
	4	15,4	3,3	2,8	4,3	6,8
	5	7,1	1,3	1,8	2,1	3,2
<b>Dor</b>	1	21,9	<b>48,2</b>	<b>56,6</b>	<b>58,7</b>	<b>31,6</b>
	2	10,1	16,5	14,0	10,7	19,5
	3	<b>24,1</b>	24,0	19,5	18,9	21,0
	4	21,5	7,9	7,2	8,9	17,4
	5	17,2	2,4	2,0	1,6	7,4
	6	5,1	0,9	0,7	1,1	3,1
<b>Saúde mental</b>	1	9,9	21,1	30,6	26,5	25,0
	2	18,6	<b>43,5</b>	<b>39,8</b>	<b>39,2</b>	24,6
	3	<b>37,4</b>	25,1	21,2	23,8	<b>32,2</b>
	4	23,3	8,8	7,2	9,3	10,1
	5	10,9	1,5	1,1	1,1	8,1
<b>Vitalidade</b>	1	4,7	4,6	9,0	8,6	20,9
	2	15,8	32,3	<b>35,7</b>	<b>42,6</b>	<b>32,7</b>
	3	24,3	<b>34,9</b>	35,0	27,2	27,0
	4	<b>33,4</b>	20,4	14,7	16,8	12,6
	5	21,7	7,7	5,7	4,8	6,8
<b>Média do índice SF-6D (DP)</b>		0,75 (0,11)	0,84 (0,08)*	0,85 (0,08)*	0,85 (0,09)*	0,85

DP: desvio padrão. Nível modal assinalado a negrito. \*  $p < 0,001$ .

Deverá ler-se:

**A negrito, o valor 37,9.**

Tabela 3 – Estimativas da população relativamente às dimensões do SF-6D (%)

Dimensões do SF-6D / níveis		Amostra inicial (n = 506)	Seguimento a 3 meses (n = 458)	Seguimento a 6 meses (n = 457)	Seguimento a 1 ano (n = 442)	População Portuguesa <sup>42</sup>
<b>Função física</b>	1	4,3	4,4	9,0	12,7	<b>37,8</b>
	2	5,3	17,7	19,5	23,5	31,2
	3	26,9	<b>42,0</b>	<b>38,9</b>	<b>33,0</b>	18,1
	4	25,5	27,6	24,3	20,6	2,9
	5	<b>28,5</b>	5,7	6,3	8,1	7,9
	6	9,5	2,6	2,0	2,0	2,2
<b>Limitação do desempenho</b>	1	10,5	24,3	34,4	<b>39,9</b>	<b>44,8</b>
	2	12,6	26,8	25,6	21,2	12,0
	3	4,5	2,0	2,2	1,8	13,8
	4	<b>72,3</b>	<b>46,9</b>	<b>37,9</b>	37,1	29,4
<b>Função social</b>	1	<b>30,4</b>	<b>59,9</b>	<b>64,3</b>	<b>67,2</b>	<b>55,8</b>
	2	20,6	26,4	21,0	19,1	15,5
	3	26,5	9,0	10,1	7,3	18,7
	4	15,4	3,3	2,8	4,3	6,8
	5	7,1	1,3	1,8	2,1	3,2
<b>Dor</b>	1	21,9	<b>48,2</b>	<b>56,6</b>	<b>58,7</b>	<b>31,6</b>
	2	10,1	16,5	14,0	10,7	19,5
	3	<b>24,1</b>	24,0	19,5	18,9	21,0
	4	21,5	7,9	7,2	8,9	17,4
	5	17,2	2,4	2,0	1,6	7,4
	6	5,1	0,9	0,7	1,1	3,1
<b>Saúde mental</b>	1	9,9	21,1	30,6	26,5	25,0
	2	18,6	<b>43,5</b>	<b>39,8</b>	<b>39,2</b>	24,6
	3	<b>37,4</b>	25,1	21,2	23,8	<b>32,2</b>
	4	23,3	8,8	7,2	9,3	10,1
	5	10,9	1,5	1,1	1,1	8,1
<b>Vitalidade</b>	1	4,7	4,6	9,0	8,6	20,9
	2	15,8	32,3	<b>35,7</b>	<b>42,6</b>	<b>32,7</b>
	3	24,3	<b>34,9</b>	35,0	27,2	27,0
	4	<b>33,4</b>	20,4	14,7	16,8	12,6
	5	21,7	7,7	5,7	4,8	6,8
<b>Média do índice SF-6D (DP)</b>		0,75 (0,11)	0,84 (0,08)*	0,85 (0,08)*	0,85 (0,09)*	0,85

DP: desvio padrão. Nível modal assinalado a negrito. \*  $p < 0,001$ .

Na página 406, Figura 4, onde se lê:  
**O eixo do índice SF-6D com valores entre 0 a 50.**




Figura 4 – Comparação das estimativas da média do índice SF-6D dos doentes antes e um ano após a cirurgia com a população portuguesa<sup>42</sup> por género e grupo etário

Deverá ler-se:

**O eixo do índice SF-6D com valores entre 0 a 1.**




Figura 4 – Comparação das estimativas da média do índice SF-6D dos doentes antes e um ano após a cirurgia com a população portuguesa<sup>42</sup> por género e grupo etário

Artigo publicado com erros: <https://actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/10241>



<https://doi.org/10.20344/amp.12927>