

APPENDIX

**Table 1- ISTH-BAT Original English Version**

ISTH-BAT- Original English Version		Score
<b>Epistaxis</b>		
No/trivial		0
- > 5/year or - more than 10 minutes		1
Consultation only		2
Packing or cauterization or antifibrinolytic		3
Blood transfusion or replacement therapy (use of hemostatic blood components and rFVIIa) or desmopressin		4
<b>Cutaneous</b>		
No/trivial		0
For bruises 5 or more (> 1cm) in exposed areas		1
Consultation only		2
Extensive		3
Spontaneous hematoma requiring blood transfusion		4
<b>Bleeding from minor wounds</b>		
No/trivial		0
- > 5/year or - more than 10 minutes		1
Consultation only		2
Surgical hemostasis		3
Blood transfusion, replacement therapy, or desmopressin		4
<b>Oral cavity</b>		
No/trivial		0
Present		1
Consultation only		2
Surgical hemostasis or antifibrinolytic		3
Blood transfusion, replacement therapy or desmopressin		4
<b>GI bleeding</b>		
No/trivial		0
Present (not associated with ulcer, portal hypertension, hemorrhoids, angiodysplasia)		1
Consultation only		2
Surgical hemostasis, antifibrinolytic		3
Blood transfusion, replacement therapy or desmopressin		4
<b>Hematuria</b>		
No/trivial		0
Present (macroscopic)		1
Consultation only		2

<b>Tooth extraction</b>		
No/trivial or none done		0
Reported in <25% none done of all procedures, no intervention		1
Reported in >25% of all procedures, no intervention		2
Resuturing or packing		3
Blood transfusion, replacement therapy or desmopressin		4
<b>Surgery</b>		
No/trivial or none done		0
Reported in <25% none done of all procedures, no intervention		1
Reported in >25% of all procedures, no intervention		2
Surgical hemostasis or antifibrinolytic		3
Blood transfusion, replacement therapy or desmopressin		4
<b>Menorrhagia</b>		
No/trivial		0
Consultation only or -Changing pads more frequently than every 2 hours or -Clot and flooding or -PBAC score>100		1
-Time off work/school > 2/year or -Requiring antifibrinolytics or hormonal or iron therapy		2
- Requiring combined treatment with antifibrinolytics and hormonal therapy or -Present since menarche and > 12 months		3
-Acute menorrhagia requiring hospital admission and emergency treatment or -Requiring blood transfusion, Replacement therapy, Desmopressin, or -Requiring dilatation & curettage or endometrial ablation or hysterectomy)		4
<b>Post-partum hemorrhage</b>		
No/trivial or no deliveries		0
Consultation only or - Use of syntocin or - Lochia > 6 weeks		1
- Iron therapy or - Antifibrinolytics		2
- Requiring blood transfusion, replacement therapy, desmopressin or - Requiring examination under anaesthesia and/or the use of uterin balloon/package to tamponade the uterus		3
- Any procedure requiring critical care or surgical intervention (e.g. hysterectomy, internal iliac artery ligation, uterine artery embolization, uterine brace sutures)		4
<b>Muscle hematomas</b>		
Never		0
Post trauma, no therapy		1
Spontaneous, no therapy		2
Spontaneous or traumatic, requiring desmopressin or replacement therapy		3
Spontaneous or traumatic, requiring surgical intervention or blood transfusion		4
<b>Hemarthrosis</b>		
Never		0
Post trauma, no therapy		1
Spontaneous, no therapy		2

<b>CNS bleeding</b>		
Never		0
Subdural, any intervention		3
Intracerebral, any intervention		4
<b>Other bleedings</b>		
No/trivial		0
Present		1
Consultation only		2
Surgical hemostasis, antifibrinolytics		3
Blood transfusion or replacement therapy or desmopressin		4

Table 2- ISTH-BAT European Portuguese Version

ISTH-BAT- Versão Portuguesa		
<b>Este questionário destina-se ao preenchimento pelo médico assistente e pretende avaliar a presença e gravidade de sintomas hemorrágicos que possam ter surgido ao longo da vida do doente. Em cada um dos 14 itens, deve ser selecionada a opção que mais se aplica à história hemorrágica do doente.</b>		
Tipo de hemorragia		Pontuação
<b>Epistaxis (hemorragia pelo nariz)</b>		
Não/Insignificante		0
Mais do que 5 episódios/ano ou episódios com duração superior a 10 minutos		1
Recorreu a uma consulta médica por causa destas hemorragias		2
Necessidade de tamponamento, cauterização ou administração de anti-fibrinolíticos		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Equimoses Cutâneas ("pisaduras" ou "nódoas negras")</b>		
Não/Insignificante		0
5 ou mais equimoses (>1cm) em áreas expostas		1
Recorreu a uma consulta médica por causa destas hemorragias		2
Equimoses extensas		3
Hematoma espontâneo (sem história prévia de trauma) com necessidade de transfusão sanguínea		4
<b>Hemorragia de feridas minor ( de pequenas dimensões e profundidade)</b>		
Não/Insignificante		0
Mais do que 5 episódios/ano ou episódios com duração superior a 10 minutos		1
Recorreu a uma consulta médica por causa desta hemorragia		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Hemorragia da cavidade oral (sangue na boca)</b>		
Não/Insignificante		0
Presente		1
Recorreu a uma consulta médica por causa desta hemorragia		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia ou de administração de antifibrinolíticos		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Hemorragia Gastrointestinal (sangue nas fezes ou nos vômitos)</b>		
Não/Insignificante		0
Presente- não associada com hipertensão portal, úlcera, hemorroidas, angiodisplasia		1
Recorreu a uma consulta médica por causa desta hemorragia		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia ou de administração de antifibrinolíticos		3

Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Hematúria (sangue na urina)</b>		
Não/Insignificante		0
Presente- macroscópica (sangue visível na urina)		1
Recorreu a uma consulta médica por causa desta hemorragia		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia ou terapêutica com ferro		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Hemorragia nas extrações dentárias (retirada de dentes)</b>		
Não/Insignificante ou nunca fez		0
Hemorragia em ≤25% dos procedimentos, sem necessidade de intervenção		1
Hemorragia em >25% dos procedimentos, sem necessidade de intervenção		2
Necessidade de refazer a sutura ou realizar tamponamento no local da extração		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Cirurgia</b>		
Não/Insignificante ou nunca fez		0
Hemorragia em ≤25% dos procedimentos, sem necessidade de intervenção		1
Hemorragia em >25% dos procedimentos, sem necessidade de intervenção		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia ou de administração de antifibrinolíticos		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Menorragia (menstruação abundante)</b>		
Não/Insignificante		0
Recorreu a consulta médica devido à menstruação abundante ou necessidade de trocar o penso mais frequentemente do que de 2/2h, ou presença de coágulos e fluxo abundante ou PBAC >100		1
Necessidade de faltar ao trabalho/escola > 2x/ano ou necessidade de agentes antifibrinolíticos ou anticoncepcional oral (pílula) ou terapêutica com ferro		2
Necessidade de tratamento combinado com antifibrinolíticos e anticoncepcional oral (pílula) ou menstruação abundante desde a menarca (primeira menstruação) e há >12meses		3
Necessidade de internamento hospitalar e tratamento emergente ou necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição(uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou desmopressina ou necessidade de dilatação e curetagem ou ablação endometrial ou histerectomia (retirada do útero)		4
<b>Hemorragia pós-parto</b>		
Não/Insignificante ou sem partos		0
Recorreu a consulta médica ou necessidade de administração de oxitocina ou lóquios durante mais do que 6 semanas		1
Necessidade de terapêutica com ferro ou antifibrinolíticos		2
Necessidade de transfusão sanguínea, de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII), administração de desmopressina ou necessidade de ser observada sob anestesia e/ou uso de balão uterino para tamponamento		3
Necessidade de internamento em cuidados intensivos ou intervenção cirúrgica (histerectomia,		4

laqueação da artéria ilíaca interna, embolização da artéria uterina)		
<b>Hematomas musculares</b>		
Nunca		0
Hematoma muscular pós-trauma, sem necessidade de tratamento		1
Hematoma muscular espontâneo, sem necessidade de tratamento		2
Hematoma muscular espontâneo ou traumático, com necessidade de desmopressina ou terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII)		3
Hematoma muscular espontâneo ou traumático com necessidade de transfusão sanguínea ou intervenção cirúrgica		4
<b>Hemartrose (sangue numa ou mais articulações)</b>		
Nunca		0
Hemartrose pós-trauma, sem necessidade de tratamento		1
Hemartrose espontânea, sem necessidade de tratamento		2
Hemartrose espontânea ou traumática, com necessidade de desmopressina ou terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII)		3
Hemartrose espontânea ou traumática com necessidade de transfusão sanguínea ou intervenção cirúrgica		4
<b>Hemorragia do sistema nervosa central (cabeça)</b>		
Nunca		0
Hemorragia subdural, com necessidade de intervenção		3
Hemorragia intracerebral, com necessidade de intervenção		4
<b>Outras Hemorragias (hemorragia do coto umbilical, cefalohematoma, hematoma na bochecha provocado pela sucção durante a amamentação, hemorragia conjuntival ou hemorragia excessiva após circuncisão ou punção venosa)</b>		
Não/Insignificante		0
Presente		1
Recorreu a uma consulta médica por causa desta hemorragia		2
Necessidade de cirurgia para controlar a hemorragia ou de administração de antifibrinolíticos		3
Necessidade de transfusão sanguínea ou de terapêutica de reposição (uso de componentes hemostáticos ou rFVII) ou administração de desmopressina		4
<b>Pontuação total</b>		